



Votre check-list en cas d'infestation.

1. Traitement

Traiter le crâne du patient aussi rapidement que possible avec le shampooing anti-poux mosquito® med 10.

2. Famille

Tous les membres de la famille doivent être examinés avec le plus grand soin pour détecter les lentes et les poux et traités préventivement avec le shampooing anti-poux mosquito® med 10.

3. Linge

Pour éliminer tous les poux du linge, les serviettes de toilette, bonnets, taies d'oreiller et autres doivent être lavés à au moins 60 °C.

4. Nettoyage

Les peignes et brosses peuvent être lavés dans une solution savonneuse chaude avec une brosse à lessive. Les autres objets non lavables étant entrés en contact avec la tête du patient (par ex. casques de vélo) sont à conserver trois jours dans un sac en plastique fermé (sans nourriture, les poux ne survivent pas plus longtemps).

5. Informer

Les maternelles, écoles et toutes les personnes en contact avec votre enfant doivent être informées pour éviter toute propagation des poux.

6. Contrôle

Effectuer ensuite des contrôles quotidiens. Si vous trouvez encore des poux vivants, vous devez répéter immédiatement le traitement avec le shampooing anti-poux mosquito® med 10. Même si vous ne trouvez plus de poux, il faut répéter le traitement au bout de 7 à 10 jours.

7. Protection

Comme mesure préventive, on peut utiliser le spray anti-poux mosquito®. Il prévient jusqu'à 12 heures.



Shampooing anti-poux 10
100 ml
PZN 10415469



Également disponible
en flacon de taille
familiale 200 ml
PZN 10415475



Spray de défense anti-poux
100 ml
PZN 10834982



Peigne à poux
avec loupe intégrée
PZN 01873902.

¹ Utiliser les produits de protection contre les poux mosquito® avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.